

| CARACTERÍSTICAS           | LINFEDEMA PRIMARIO                        | LINFEDEMA SECUNDARIO                      | LIPEDEMA                                                                                                          | INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SEXO                      | MULLER/HOME                               | MULLER/HOME                               | MULLER                                                                                                            | MULLER/HOME                  |
| IDADE DE APARICIÓN        | Conxénito/Precoz/Tardío                   | Máis habitual >30 anos                    | Puberdade/Embarazo/Menopausa                                                                                      | Máis habitual >50 anos       |
| BILATERALIDADE            | Pode ser nunha perna ou brazo ou nas dúas | Pode ser nunha perna ou brazo ou nas dúas | Nas dúas pernas e/ou brazos                                                                                       | Nas dúas pernas              |
| SIMETRÍA                  | Asimétrico                                | Asimétrico                                | Adoitan ser as dúas pernas ou brazos semellantes                                                                  | Adoita ser asimétrico        |
| COR                       | Normal e pode ser brillante avermellado   | Normal e pode ser brillante avermellado   | Normal se só hai lipedema, ou brillante avermellado se tamén hai problemas linfáticos ou venosos                  | Marrón/ocre                  |
| LOCALIZACIÓN              | Dende os dedos cara ao ombreiro/cadeira   | Dende os dedos cara ao ombreiro/cadeira   | Aparece sobre todo nas pernas, aínda que tamén pode estar en brazos ou cadeira. Os pés e mans non están afectados | Xemelgos                     |
| DOR                       | NON                                       | NON                                       | SI                                                                                                                | Rixidez/calor                |
| PROBLEMAS DE PEL          | FASE AVANZADA                             | FASE AVANZADA                             | FASE AVANZADA                                                                                                     | FASE AVANZADA                |
| MELLORA AO MANTER EN ALTO | SI EN FASE INICIAL                        | SI EN FASE INICIAL                        | NON                                                                                                               | SI ATA FASE MOI AVANZADA     |
| FÓVEA                     | POUCA                                     | POUCA                                     | NON                                                                                                               | SI                           |